

SAVAGE

PAÍS DE ORIGEN

CHINA

NOMBRE COMERCIAL

SAVAGE

INGREDIENTE ACTIVO

Abamectin + Spirodiclofen

CONCENTRACIÓN

Abamectin 20 g/l

Spirodiclofen 200 g/l

FORMULACIÓN

Suspensión concentrada (SC)

USOS Y DOSIS DEL PRODUCTO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Rosas	Ácaros (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.25 ml/l

AMBITO DE APLICACION

Invernadero

PERIODO DE REINGRESO

12 horas después de la aplicación.

INSTRUCCIONES DE USO

No se puede aplicar en áreas donde se encuentren los trabajadores, el aplicador debe contar con todos los equipos de protección agrícola

MODO DE ACCION

Abamectin: Insecticida , acaricida con acción de contacto y estomacal. Presenta actividad sistémica limitada en la planta, pero muestra movimiento translaminar.

Spirodiclofen: acaricida selectivo no sistémico que interfiere con el desarrollo de los ácaros.

MECANISMO DE ACCION

ABAMECTIN: Estimula la liberación del ácido γ -aminobutyric, inhibición de los neurotransmisores, activando los canales de cloruro.

SPIRODICLOFEN: Actúa como inhibidor de la biosíntesis de lípidos



Espagrotec®

**ORGULLO DE
SER AGRICULTOR**

COMPATIBILIDAD

No es compatible con CAPTAN.

TOXICIDAD

- Acute Oral LD50 (rat) Acute oral LD50 for rats > 5000 mg/kg b.w.
- Dermal toxicity LD50 (rat) Acute dermal LD50 for rats >2000 mg/kg b.w.
- Acute Inhalation LC50 (rat) LC50 (4 h) for rats >3.0 mg/l air
- Skin Irritation Non-irritating to rabbit skin
- Eye irritation slight irritating to rabbit eyes
- Sensitization Non-sensitizing (Guinea Pig)



Av. General Enríquez # 8 y Av. General Rumiñahui
Parroquia Cotogchoa - Vale de los Chilos
[02] 208-0350 / [02] 208-2068 / [02] 380-8224